



Bio Natural S.A.



✓ **Calidad**

✓ **Servicios**

✓ **Solución**

TRIMASUL 240 LA

SOLUCIÓN INYECTABLE - USO VETERINARIO - 100 ML.

COMPOSICIÓN.

Ingredientes activos	Contenido
Sulfadoxina.....	200.0 mg/ml.
Trimetoprina.....	40.0 mg/ml.

INDICACIONES.

TRIMASUL 240 LA INJ. es la combinación de **Sulfadoxina y Trimetoprina** que afecta la síntesis de la purina bacteriana, actúa en forma sinérgica produciendo una acción bactericida contra **gérmenes Gram (+) y Gram (-)**, está indicado para el control de infecciones **respiratorias, gastrointestinales, y urogenitales**, causadas por bacterias sensibles tales como: ***E. coli, Salmonella, Streptococcus, Pasteurella, Estafilococcus y Haemophilus spp.***

Especies animales: **Bovinos, terneros, suinos, ovinos y caprinos.**

DOSIFICACIÓN.

TRIMASUL 240 LA INJ. en las especies indicadas administrar: 1 ml. por cada 15 kg. de peso vivo 1 vez al día durante 3 a 5 días.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN.

TRIMASUL 240 LA INJ. se administra vía **Intramuscular y/o endovenosa lenta.**

Agitar el frasco antes de su uso.



Bio Natural S.A.



✓ **Calidad**

✓ **Servicios**

✓ **Solución**

MULTIVIT INJ.

Solución inyectable para administración intramuscular o subcutánea.

F O R M U L A

Ingredientes activos

Vitamina A - retinol-palmitato	15.000 IU/ml
Vitamina D ₃ - Colecalciferol	7.500 IU/ml
Vitamina E - α -Tocoferol acetato	20 mg/ml
Vitamina B ₁ - Hidrocloruro de Tiamina.....	10 mg/ml
Vitamina B ₂ - Fosfato Rivoflavina Sodica.....	5 mg/ml
Vitamina B ₆ - Hidrocloruro de Piridoxina.....	3 mg/ml
Vitamina B ₁₂ - Cianocobalamina.....	60 μ g/ml
Biotina	125 μ g/ml
Acido Fólico	150 μ g/ml
Vitamina PP- Nicotinamidico.....	50 mg/ml
D-pantotenol.....	25 mg/ml
Cloruro de Colina	12,5 mg/ml
Aminoácidos	12 mg/ml

Contenido

INDICACIONES DE USO.

Deficiencias de vitaminas en casos de stress, posterior a enfermedades, raquitismo, distrofia muscular, anemia, lesiones de la piel, afecciones nerviosas, durante el tratamiento por vermes y animales convalescientes.

DOSIFICACIÓN.

Bovinos y caballos: 10 a 15 ml.

Terneros, potros, ovejas y cabras: 5 a 10 ml.

Corderos: 5 a 8 ml.

Cerdos: 2 a 10 ml.

VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN.

PARENTERAL

Administración intramuscular o subcutánea.